

## INFOS FEMME ENCEINTE

Le virus n'est pas transmis au bébé pendant la grossesse et ne provoque pas de malformation,

### SAUF

**Si vous êtes infectée autour de la naissance** (7 jours avant et jusqu'à 2 jours après l'accouchement), le virus traverse le placenta une fois sur deux et infecte le nouveau-né. Le chikungunya peut alors avoir des conséquences graves avec une atteinte de son cerveau.

**Vous pouvez allaiter**, le virus du chikungunya n'est pas transmis par le lait maternel.

ÉPIDÉMIE EN COURS !

DES RISQUES GRAVES  
EXISTENT POUR  
LE NOUVEAU-NÉ

IL N'Y A PAS DE  
TRAITEMENT  
CONTRE LE VIRUS,

DONC  
VOUS PROTÉGER,  
C'EST PROTÉGER  
VOTRE BÉBÉ



## CONSULTATION MÉDICALE SI SYMPTÔMES DU CHIKUNGUNYA

Température > 38,5°C  
Douleurs articulaires  
Maux de tête  
Éruptions cutanées avec démangeaisons  
Conjonctivite  
Nausées vomissements

**SI VOUS L'ATTRAPEZ EN FIN DE GROSSESSE (9<sup>ème</sup> MOIS)  
→ CONSULTEZ AUX URGENCES MATERNITÉ**

## MOYENS DE PROTECTION PENDANT TOUTE LA GROSSESSE ET SURTOUT AU 9<sup>ème</sup> MOIS

Moustiquaire au niveau des portes, des fenêtres et des lits.

Vêtements longs, répulsifs adaptés.

Éviter les sorties « grand matin » et à la tombée de la nuit.

Éviter les contacts avec des personnes porteuses du virus (5 jours après le début des symptômes).

## INFOS NOUVEAU-NÉ

Il existe des formes graves chez les bébés de moins de 3 mois

PROTÉGER  
BÉBÉ

Répulsifs fortement déconseillés avant 6 mois

Protéger le bébé des piqûres de moustiques

Moustiquaire fortement recommandée jusqu'aux 6 mois du bébé