

FICHE DE SUIVI PATIENT COVID + PAR IDE

Exemplaire :

PATIENT

Nom, Prénom :

Date de naissance : Âge

Adresse :

.....

Tél :

FACTEURS DE RISQUES SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX

- Être à plus de 30 min d'un établissement de santé
- Pas de possibilité d'isolement à domicile
contactez la cellule d'isolement au 02 62 410 000
- Isolement social
- Précarité socio économique
- Difficulté linguistique
- Trouble neuro/psy
- Pas de moyen de communication dispo
- Présence d'un proche fragile au domicile

ÉQUIPE DE SOINS

MÉDECIN TRAITANT :

Tél :

INFIRMIER(E(S))

Tél :

INFIRMIER(E(S))

Tél :

SAGE FEMME

Tél :

PHARMACIEN

Tél :

AUTRE

Tél :

CRITÈRES MINEURS D'HOSPITALISATION

- < 65 ans (les personnes âgées de 50 à 65 ans doivent être surveillées de façon plus rapprochée)
- ATCD cardiovasculaires : HTA avec polythérapie, AVC, coronaropathie, chirurgie cardiaque
- Insuffisance cardiaque
- Diabète équilibré
- Pathologie respiratoire chronique susceptible de décompenser

CRITÈRES MAJEURS D'HOSPITALISATION

- Non vaccinés ou schéma vaccinal incomplet
- > 65 ans
- Diabète déséquilibré ou présentant des complications
- Pathologies chroniques destabilisées,
- Pathologie cardiovasculaire aiguë,
- Insuffisance rénale chronique justifiant une dialyse ou patient greffé,
- Cancer sous chimiothérapie,
- Immunodépression congénitale ou acquise avec infection active non Covid-19, infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm³,
- Traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
- Splenectomie ou drepanocytose homozygote
- Greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
- Cirrhose décompensée,
- Maladie neurologique ou neuro-vasculaire pouvant altérer la fonction respiratoire,
- Obésité morbide (IMC > 30 kg/m²),
- Suspicion d'embolie pulmonaire ou embolie pulmonaire non exclue (arguments cliniques et D Dimères positifs),
- Grossesse (cf fiche spécifique suivi grossesse)
- Trisomie 21

Critères de gravité
Allo Centre 15
Tél au médecin traitant

- Polypnée >22
- Nécessité d'oxygène à 4L/min ou + pour objectif de saturation > à 94% et > 90% pour les BPCO / IRC
- PAS < 90 mmH
- Déshydratation
- Altération conscience/confusion/somnolence
- Altération brutale de l'état général

