

SE CONNECTER | S'INSCRIRE

MENU

1. pathologie

2. critères

3. stratégie

VOTRE SITUATION

Pathologie : covid - 19

Dans quelle situation êtes-vous ? : Prescrire du Paxlovid

MISE À JOUR

La dernière modification de cette page date de **04 février 2022.**

NB : Les choix surlignés sont ceux qui sont privilégiés par le groupe d'experts d'ANTIBIOCLIC.

Traitement conseillé

La HAS a émis le 20/01/2022 des recommandations sur la prescription du PAXLOVID^R (nirmatrelvir + ritonavir), traitement antiviral anti-SARS-CoV-2 disponible en médecine de ville :

- Pour les **patients adultes ne nécessitant pas d'oxygénothérapie** et étant **à risque élevé d'évolution vers une forme grave** de la Covid-19.
- Traitement associant du **nirmatrelvir et du ritonavir**
- A administrer **dès que possible dans les 5 jours suivants l'apparition des symptômes**
- **Prescription de 5 jours**

Modalités de prescription

: [Fiche DGS ici \(02/02/2022\)](#)

Le prescripteur vérifie l'**éligibilité du patient au traitement** et effectue la demande d'accès précoce qui permettra de générer la prescription avec un code barre spécifique à la demande effectuée. Les données sont recueillies via une plateforme Web dédiée www.ap-paxlovid.com.

Lorsque le prescripteur souhaite instaurer le traitement, il est invité à **s'authentifier sur la plateforme** via Pro Santé Connect afin d'avoir accès à l'espace sécurisé permettant de saisir les données.

INDICATIONS DU PAXLOVID

A envisager pour les patients adultes à risque de forme grave, **quel que soit l'âge et le statut vaccinal**, et sans contre-indication au Paxlovid :

- Patients **sévèrement immunodéprimés**
- **Pathologie à très haut risque** (citée en annexe 1 de la reco HAS)
- Patients **> 65 ans avec facteurs de risques de formes graves** (cf annexes 2 et 3 de reco HAS)

ET avec diagnostic de COVID-19 avéré et symptômes évoluant de moins de 5 jours

CONTRE-INDICATIONS AU PAXLOVID

CONTRE-INDICATIONS

- Prise de médicaments induisant / dépendants fortement du CYP3A
 - > cf **tableau Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique** [ici](#)
- Grossesse ou risque de grossesse
- Allaitement
- Insuffisance rénale sévère (clairance < 30ml/min)
- Insuffisance hépatique sévère

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Le **Paxlovid est un puissant inducteur enzymatique** pouvant entraîner l'augmentation ou la diminution des concentrations sanguines des autres médicaments

> cf **tableau Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique** [ici](#)

- Insuffisance rénale modérée (clairance = 30-60 ml/min) : diminution de la posologie

PRESCRIPTION DU PAXLOVID

Médicament antiviral prévenant la réplication virale.

Prescription du PAXLOVID per os :

- **2 comprimés de nirmatrelvir** (soit 300 mg) + **1 comprimé de ritonavir** (100 mg) pris ensembles par voie orale, toutes les 12 heures, **pendant 5 jours**
- A administrer dès que possible après le diagnostic de Covid-19 et **dans les 5 jours suivants l'apparition des symptômes.**
- **Ne pas prescrire** en cas de grossesse, risque de grossesse, d'allaitement, ou chez un patient de < 18 ans.
- **En cas d'insuffisance rénale modérée** : un seul comprimé de nirmatrelvir doit être pris avec le comprimé de ritonavir toutes les 12 heures.

SOURCES

- HAS - réponse rapide - Traitement par antiviral des patients à risque de forme grave de la Covid-19 - janvier 2022
- Société française de Pharmacologie et de Thérapeutique - 4/02/2022
- DGS-Urgent N°2022_22 : Mise à disposition l'antiviral du laboratoire PFIZER : PAXLOVID®



PARTAGER

Copyright © 2022 Université Paris Diderot Département de Médecine Générale. Tous droits réservés. Réalisé par G-Design, agence web à Paris. Design inspiré par Studio KazaH. Ce site respecte les principes de la charte HONcode. Site certifié en partenariat avec la Haute Autorité de Santé (HAS). Vérifiez ici

[notre politique de confidentialité](#)