Conduite à tenir devant un patient Covid-19 positif en ambulatoire

PATIENT COVID + À DOMICILE **et** SYMPTOMES RESPIRATOIRES **ou** > 65 ans **ou** Autres facteurs de risque de forme grave **ou** Femme enceinte

CRITÈRES DE MAINTIEN À DOMICILE SANS FACTEURS DE GRAVITÉ

Suivi simple

- Télé consultation à J4 ou J5
- Fin isolement : J10 pour les non-vaccinés
  - J7 pour les vaccinés
- Si pas de fièvre depuis 48 h+/- sur avis du médecin traitant

Pas de test à la fin de l'isolement

FACTEURS DE RISQUE

Signes cliniques d'évaluation hospitalière

- Saturation pour les BPCO / IRC sat < 90 % et sat 93% pour les autres
- Nécessité oxygènothérapie sur 4L / min pour maintenir une saturation à 94%
- FR > 22Pouls > 110PAS < 90 mm Hg
- Déshydratation
- Conscience : confusion, somnolence
- Altération brutale de l'état général
- Consultation entre J6 et J12 pour contrôle
- Symptômes persistants au delà de 7 à 12 jours

Si signes + : appel SAMU

Prise en charge en HAD

Protocole HAD

Prise en charge libérale

Fiche de suivi patient par IDE

Ordonnance de prescription 0²

Où trouver de l'oxygène

Paxlovid

Ordonnance de suivi IDE non ALD

Ordonnance en ALD

Protocole thérapeutique Oxygène, anti coagulant, etc…

Protocole REPERE

Modèle d'ordonnance de suivi Sage-Femme à domicile pour les grossesses >26 SA