

**A renvoyer signé et daté par mail à [contact@urml-oi.re](mailto:contact@urml-oi.re)**

## **FICHE DE SYNTHÈSE**

### **Cahier des charges**

**Vaccination Covid Comirnaty® Pfizer et Nuvaxovid® Novavax, en cabinet de ville, officine et à domicile.**

***Depuis le 11 mai 2022, l'ouverture d'un flacon ne doit plus attendre la présence de 7 personnes ou 10 enfants. Celui-ci peut être ouvert dès la première demande et jeté après préemption.***

*Ceci est valable autant pour le vaccin Comirnaty de Pfizer Adulte et Pédiatrique que pour le Nuvaxovid de Novavax. Il suffit de renvoyer cette page signée et datée à l'URML OI et vous pourrez commander des flacons à la pharmacie habilitée de votre choix, par mail.*

### **1 SEULE DOSE DE VACCIN JUSTIFIE L'OUVERTURE D'UN FLACON !**



#### **Points de vigilance :**

#### **Comirnaty (PFIZER)**

Habilitation à ce jour de plusieurs pharmacies en fonction d'un cahier des charges (réception et stockage /chaîne du froid).

- Durée de conservation dans les réfrigérateurs des pharmacies ad hoc pendant 30 jours ;
- Tout flacon avant ouverture doit être conservé dans un réfrigérateur avec traçabilité **obligatoire** de **suivi** de température ;
- Reconstitution avec le matériel fourni **après 15 minutes** à température **ambiante** du vaccin ;
- Reconstitution possible par le pharmacien permettant aux IDE et médecins vaccinateurs de récupérer des seringues unidoses pré remplies ;
- Conservation du vaccin à température **ambiante** (maximum 30°C) **jusqu'à 6 heures après la reconstitution** ;
- Transport entre l'officine et le cabinet médical / domicile selon des containers correspondant au cahier des charges de l'ARS (renseignez-vous auprès de vos pharmacies) : flacon **droit sans secousses** ou seringues tenues **horizontales** ;
- **Attention !** Ne pas mettre en **dessous** de 2°C, risques de **recongélation**, et **pas au-delà** de 30°C ;
- **Commande pour à minima 3 doses.**

➔ Le retrait du flacon par le médecin, IDE en pharmacie habilitée se fait uniquement **le jour** des vaccinations à effectuer par le PS, soit avec une **thermo-box testée par PHARMAR** ou **glacière** avec **conservation du froid entre 2°C et 30°C** éventuellement **contrôlée** par thermomètre (de 2°C à 30°C).

#### **Nuvaxovid (NOVAVAX)**

- Le flacon non ouvert est **stable pendant 12 heures à 25°C** ;
- Pas de reconstitution avant utilisation ;
- Le flacon ouvert se conserve 6 heures, de 2 à 25°C, mais il est conseillé de **le conserver entre 2 et 8°C** ;
- Il ne peut être utilisé que pour **les premières et deuxièmes doses** mais pas à ce jour pour le rappel qui doit être fait par un vaccin à ARN messenger ;
- Un flacon contient 10 doses.



**Flacon usagé à mettre dans les DASRI.**

Date

Signature + cachet