

# Le nouveau Pfizer Comirnaty 6 mois 4 ans est disponible à la commande à La Réunion depuis le 23 janvier.

La vaccination par le vaccin Comirnaty (**posologie pédiatrique de 3 µg**) **s'élargit aux enfants de 6 mois à 4 ans**. Une extension de l'AMM du vaccin COMIRNATY aux enfants âgés de 6 mois à 4 ans a été octroyée le 20 octobre 2022.

La primovaccination des enfants de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de Covid-19 ou appartenant à l'entourage des personnes immunodéprimées ou ne répondant pas à la vaccination, est depuis le 23 janvier 2023 possible.

## Le vaccin

Celui-ci est distribué au niveau national. Il sera disponible à la Réunion dès lundi 23 janvier 2023.

Il s'agit d'une forme pédiatrique du vaccin Pfizer-BioNTech, adaptée à cette tranche d'âge. Il est moins dosé (3 µg) que les formes disponibles pour les enfants de 5 à 11 ans (10 µg) et pour les adultes de 12 ans et plus (30 µg).

Vaccin à reconstituer avec Solvant de dilution (ampoules de NaCl), SOL INJ NACL 0.9%.

## Conservation

**Les flacons non ouverts peuvent être conservés**

- ! pendant un maximum de 10 semaines entre +2°C et +8°C,
- ! pendant un maximum de 12 heures à des températures allant jusqu'à +30°C

## Effecteurs de la vaccination Comirnaty 6 mois-4 ans :

- ! Seuls les médecins sont autorisés à prescrire et administrer le vaccin
- ! Les sages-femmes et les infirmiers diplômés d'Etat (IDE) sont autorisés à leur administrer le vaccin **dès lors que celui-ci a été prescrit par un médecin.**

La personne qui accompagne l'enfant doit pouvoir établir qu'elle détient l'accord parental et présenter un formulaire d'autorisation parentale dûment signé par les deux parents.

## Indication

**1. Aux enfants de 6 mois à 4 ans révolus à risque de formes graves de Covid-19 et de décès. Les comorbidités suivantes ont pu être identifiées comme plaçant les enfants à risque de développer une forme sévère de la maladie :**

- Les cardiopathies congénitales ;
- Les maladies hépatiques chroniques ;
- Les maladies cardiaques et respiratoires chroniques (y compris l'asthme sévère nécessitant un traitement continu) ;
- Les maladies neurologiques ;

- L'immunodéficience primitive ou induite par médicaments ;
- L'obésité ;
- Le diabète ;
- Les hémopathies malignes ;
- La drépanocytose ;
- La trisomie 21.

Egalement, les enfants porteurs d'une des comorbidités identifiées préalablement chez les adultes comme à risque de développer une forme grave de la maladie sont également concernés par cette recommandation (cancer récent, maladie rénale chronique, handicap neurologique, etc.).

## **2. Aux enfants de 6 mois à 4 ans révolus vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou non répondeurs à la vaccination.**

### **Posologie**

Le schéma vaccinal comprend **trois doses de 3 µg** d'ARNm chacune, avec un intervalle de **trois semaines** entre les deux premières doses, puis un délai d'au moins **huit semaines** avant la troisième dose.

Même en cas d'infection au Covid-19 survenue avant le début du schéma vaccinal ou entre les différentes injections (exemple : infection survenant avant la 1ère injection, ou entre la 1ère et la 2e injection ou entre la 2e et la 3e injection), **les trois doses devront in fine être réalisées, pour garantir une protection optimale.**

**En cas d'infection au Covid-19, un délai de 3 mois devra être respecté entre l'infection et l'injection.**

### **Les dispositifs médicaux associés pour ce produit sont identiques à ceux du vaccin Comirnaty® pédiatrique 5-11 ans**

- seringue 1ML-aig 25G-16MM
- Seringue de reconstitution 3 ml
- Aiguille de reconstitution 21G-40MM
- Solvant de dilution (ampoules de NaCl), SOL INJ NACL 0.9% AMP 10 ML