

LISTE DES PATHOLOGIES DES PERSONNES A TRES HAUTS RISQUES (Recommandation 4 semaines après la 3ème dose)



- Atteintes de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie, traités par anti-CD20, et chez ceux atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) ;
- Atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ;
- Transplantées d'organes solides ;
- Transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ;
- Atteintes de poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d'organes ;
- Atteintes de certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d'infection (liste spécifique COS) établie par le COSV et les filières de santé maladies rares) ;"
- Atteintes de trisomie 21 ;
- Atteintes de mucoviscidose ;
- Syndrome de Brugada ;
- Maladies auto-immunes systémiques rares : patients sous corticothérapie à forte dose de manière prolongée ;
- Traitement par corticoïde >10 mg/jour d'équivalent prednisone pendant plus de 2 semaines ;
- Maladies auto-immunes systémiques sous traitement par immunosuppresseur fort de type :
 - Antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) ;
 - AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima).

